

Lapisa

Minoxel[®] L.A. **Bovinos**

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-220
SUSPENSIÓN OLEOSA INYECTABLE
CEFTIOFUR ÁCIDO LIBRE CRISTALINO ANTIBIÓTICO
USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Ceftiofur ácido libre cristalino estéril	200 mg/mL
Vehículo c.b.p.	1 mL

INDICACIONES:

Para el tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina (BRD, fiebre del transporte, neumonía) asociada con *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni* en Bovinos productores de leche y carne.

Para el tratamiento de (necrobacilosis interdigital) asociada con *Fusobacterium necrophorum* y *Porphyromonas levii* en Bovinos productores de leche y carne.

Minoxel L.A Bovinos también está indicado para el tratamiento de metritis aguda (10 días post parto) asociada contra bacterias como *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* y *Fusobacterium necrophorum*.

ESPECIE:

Bovinos (Productores de leche y carne).

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Para inyección subcutánea (SC) en el tercio medio de la cara posterior de la oreja o en la base de la oreja.

Dosis única: aplicar 1.5 mL de **Minoxel L.A. Bovinos** por cada 45 kg de peso corporal lo que equivale a administrar 6.6 mg/kg de Ceftiofur Ácido Libre Cristalino. En casos de Metritis aguda repetir esta dosis en la cara posterior de la oreja opuesta, después de 72 horas de la dosis inicial.

PERIDO DE RETIRO:

13 días en carne

0 días en leche

ADVERTENCIAS:

Evite el contacto con la piel de personas alérgicas a los β-lactámicos.

No administre más de 10 mL en el mismo sitio de inyección.

No se administre en animales que previamente hayan mostrado hipersensibilidad a Ceftiofur o a otros antibióticos β-lactámicos.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacénese en un lugar fresco y seco, a una temperatura de 30 °C. Agítese bien antes de utilizarse. Una vez de haber extraído la primera dosis almacenar a una temperatura de 20-25 °C durante 90 días.

El uso fuera de las indicaciones del producto puede generar resistencia antimicrobiana. Los recipientes vacíos, así como cualquier contenido residual, deben desecharse de acuerdo a la normatividad vigente / eliminar los envases en el centro de acopio más cercano.

PRESENTACIONES:

Frasco con 100 mL



ESPECIE:



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA