

# LAPI-RACTO<sup>®</sup>

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-158  
Promotor de Crecimiento en Premezcla  
**USO VETERINARIO**

## FÓRMULA:

Cada kg contiene:	
Clorhidrato de ractopamina	24 g
Excipiente c.b.p.	1 kg

## INDICACIONES:

**LAPI-RACTO<sup>®</sup>** es efectivo para aumentar la tasa de ganancia de peso, mejorar la eficiencia alimenticia, incrementar el porcentaje de rendimiento de la canal y de cortes magros en cerdos en finalización que reciben una dieta nutricionalmente balanceada.

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Adminístrese por vía oral a través del alimento balanceado.

Las dosis recomendadas de **LAPI-RACTO<sup>®</sup>** en el alimento final son:

- 208g de Lapiracto por Ton de alimento terminado (5 ppm) de ractopamina o de 416 g por Tonelada de alimento terminado para (10 ppm) de ractopamina, para aumentar la tasa de ganancia de peso, mejorar la eficiencia alimenticia, aumentar el porcentaje de rendimiento de la canal así como el porcentaje de carne magra de la canal.

## INSTRUCCIONES DE MEZCLADO:

Todos los cálculos descritos en esta sección están hechos sobre una base de 90% de materia seca.

Para asegurar la distribución homogénea de **LAPI-RACTO<sup>®</sup>**, se recomienda preparar una premezcla intermedia antes de mezclar con

el alimento final (Cuadro 1).

### Cuadro 1

#### PREPARACION DE PREMEZCLA INTERMEDIA A PARTIR DE LAPI-RACTO<sup>®</sup> (24 g/kg).

Kilogramos de Premezcla Intermedia	90
Kilogramos de LAPI-RACTO <sup>®</sup> a mezclar con premezcla intermedia	10
Concentración final de Clorhidrato de Ractopamina en la Premezcla Intermedia (g/kg)	2.4

Luego, mezcle completamente esta premezcla intermedia de **LAPI-RACTO<sup>®</sup>**, con el alimento completo para cerdos en finalización (Cuadro 2).

Este alimento finalizador deberá contener por lo menos 16% de proteína cruda. Se recomienda que el rango de la concentración final de lisina total se encuentre por lo menos al 0.8% para obtener un alimento final conteniendo entre 5 y 10 ppm de Clorhidrato de Ractopamina. Esto deberá ser consultado y decidido en conjunto con el nutriólogo que elabore las formulaciones del alimento.

### Cuadro 2

#### PREPARACIÓN DE ALIMENTO FINAL A PARTIR DE LA PREMEZCLA INTERMEDIA.

Kilogramos de alimento final a usar para la mezcla	997.5
Kilos de premezcla intermedia	2.5
Concentración final de ractopamina (g/ton métrica o ppm)	6

## INSTRUCCIONES PARA ALIMENTAR A LOS CERDOS:

Proporcionar continuamente, en las últimas tres



a cuatro semanas de la fase de finalización, siempre y cuando se hayan hecho los ajustes en los niveles nutricionales de la fórmula alimenticia. Se recomienda proporcionar a cerdos de al menos 75 kg de peso vivo, durante el periodo que ganan los últimos 25 a 35 kg de peso antes del sacrificio.

**PERIODO DE RETIRO:**

No es necesario retirar este producto del alimento antes del sacrificio.

**PRECAUCIÓN:**

No utilizar en animales destinados a la reproducción.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a una temperatura entre 15 y 30 °C.

**ADVERTENCIAS:**

El ingrediente activo, Clorhidrato de Ractopamina, es un beta agonista – adrenérgico.

Los individuos con enfermedad cardiovascular deben tomar precauciones para evitar la exposición.

Use el equipo de protección adecuado completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de mezclado: gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos, lentes para protección de los ojos, guantes y botas de neopreno.

Después de la operación de mezclado, descontamine el equipo de protección, báñese y póngase ropa limpia.

Sí ocurriera un contacto accidental con los ojos, enjuagar minuciosamente y de inmediato con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica.

**PRESENTACIÓN:**

Saco de 10 kg.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA  
CUANTIFICADA  
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO  
VETERINARIO**

Hecho en México por:  
**LAPISA, S. A. DE C. V.**  
Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,  
Col. Camelinas, C. P. 59375,  
La Piedad Michoacán, México.  
Tel + 52(352) 526-13-00  
[www.lapisa.com](http://www.lapisa.com)  
224-SAN-F T-02B

