

Larvakill[®] Premix

RSCO-PEC-INAC-0173-310-001-001
Premezcla larvicida para alimento

COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo	% en peso
Cyromazina	
N-ciclopropil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina	
Conteniendo no menos de: (equivalente a 10 g de i.a./kg)	1
Ingredientes inertes: Vehículos y estabilizadores	
Conteniendo no más de:	99
TOTAL	100

DESCRIPCIÓN:

Es un regulador sintético del crecimiento de insectos con actividad contra moscas y pulgas. Su actividad se manifiesta por contacto, interfiriendo en el proceso de muda en los estadios larvales que previene la pupación normal, provocando pupas deformadas que impide la eclosión de moscas y pulgas adultas. Evita el desarrollo larvario y la pupación de la mosca del establo (*Stomoxys calcitrans*), mosca del cuerno (*Haematobia irritans*), pequeña mosca doméstica (*Fannia canicularis*), mosca del estiércol de los pollos (*Fannia pusio*), mosca doméstica (*Musca domestica*), mosca de la fruta (*Drosophila melanogaster*) y otras larvas de dípteros que se reproducen en el estiércol o en desechos en fermentación.

ESPECTRO DE ACCIÓN:

Larvas de moscas:	
Mosca del establo	<i>Stomoxys calcitrans</i>
Mosca del cuerno	<i>Haematobia irritans</i>
Pequeña mosca doméstica	<i>Fannia canicularis</i>
Mosca del estiércol de los pollos	<i>Fannia pusio</i>
Mosca doméstica	<i>Musca domestica</i>
Mosca de la fruta	<i>Drosophila melanogaster</i>

MODO DE EMPLEO:

Larvakill[®] Premix se adiciona al alimento balanceado de las ponedoras durante su elaboración. Las gallinas lo ingieren en cada

ración diaria, siendo eliminado con las heces, donde actúa sobre las larvas de las moscas que se desarrollan en la gallinaza.

DOSIS:

Mezclar 500 gramos de **LARVAKILL[®] PREMIX** por tonelada de alimento de las aves al iniciar la temporada de moscas durante 6 semanas para impedir el desarrollo de éstas, los resultados serán observados 2 a 3 semanas posteriores al inicio del tratamiento, tiempo en el que finalizó el ciclo de vida de la mosca que estaba presente.

VENTAJAS:

- Mecanismo de acción diferente por ser un regulador del crecimiento de los insectos que actúa inhibiendo la muda y la pupación.
- Usado dentro de un programa integral de larvicida y adulticidas evita la reinfestación de moscas.

PRECAUCIONES:

Tiempo de retiro: No consumir la carne de aves tratadas hasta tres días después de terminar la adición de este.

Evite contaminar las fuentes de agua con los residuos del lavado o limpieza.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales.

Almacénese en un lugar fresco y seco.



Evitar al máximo la entrada de agua sobre lagallinaza y la cama para no diluir al Larvakill[®] Premix por debajo de la concentración mínima de efectividad larvicida.

PRESENTACIONES:

Saco de 20 kilos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

