



# Lapisa Minoxel<sup>®</sup> L.A. Cerdos

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-199

Suspensión Inyectable

**USO VETERINARIO**

## FÓRMULA:

Cada kg contiene:	
Ceftiofur Ácido Libre Cristalino	100 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

## DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD:

Enfermedad de tipo respiratorio causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis* y *Streptococcus suis* que afecta el tracto respiratorio del cerdo. La transmisión es de cerdo a cerdo y las altas densidades así como las prácticas de manejo inadecuadas aumentan la predisposición a la enfermedad. Los signos pueden variar desde una severa enfermedad respiratoria del tipo crónico hasta muerte súbita. El momento más crítico se da en animales en crecimiento, porque los cerdos al ser reagrupados y mezclados, sufren de altos niveles de estrés, pierden inmunidad pasiva y puede resultar en casos de neumonía a las dos o tres semanas post destete.

## INDICACIONES:

**Lapisa Minoxel<sup>®</sup> L.A. Cerdos** está indicado para el tratamiento de la Enfermedad Respiratoria Porcina asociada con *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis* y *Streptococcus suis*.

## DOSIS:

Una sola aplicación de 5 mg de Ceftiofur por kg de peso corporal, equivalentes a 1 mL por cada 20 kg de peso corporal. En caso de ser necesario, se puede repetir la dosis a los

7 días posteriores a la primera aplicación.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular, en la tabla del cuello.

## PERÍODO DE RETIRO:

No deberá usarse este producto 14 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

## ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Evite el contacto con la piel de personas alérgicas a los  $\beta$ -lactámicos.

Puede ocurrir trombocitopenia y anemia reversible en animales a los que se administra de tres a cinco veces la dosis recomendada. Los cerdos que pesan más de 40 kg requerirán más de una inyección ya que no se puede exceder 2 mL por sitio de aplicación.

Eliminar los envases en el Centro de Acopio más cercano.

## CONTRAINDICACIONES:

No se administre en animales que previamente hayan mostrado hipersensibilidad a Ceftiofur o a otros antibióticos  $\beta$ -lactámicos.

Las personas que manejan este medicamento deberán tener cuidado



para evitar la exposición repetida o prolongada para prevenir la sensibilización a los antimicrobianos que pueden ocurrir en individuos susceptibles.

Evitar el contacto directo con ojos, boca o piel.

Aquellos con una hipersensibilidad conocida deben evitar la exposición a este medicamento.

#### ALMACENAMIENTO:

Almacénese a una temperatura ambiente controlada entre 15 y 30 °C.

#### PRESENTACIONES:

100 mL.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA  
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO**

Hecho en México por:

**LAPISA, S. A. DE C. V.**

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,

Col. Camelinas, C. P. 59375,

La Piedad Michoacán, México.

Tel + 52(352) 526-13-00

www.lapisa.com

071-SAN-FT-02A

