

# Lactotropina<sup>®</sup>

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-212

Suspensión inyectable estéril

**USO VETERINARIO**

## FÓRMULA:

Cada jeringa contiene:	
Somatotropina bovina zinc	500 mg
Excipiente c.b.p	1.4 mL

## INDICACIONES:

**Lactotropina<sup>®</sup>** se utiliza para aumentar la producción de leche y eficiencia productiva en vacas lecheras sanas.

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:


**Lactotropina<sup>®</sup>** se administra cada 14 días mediante una inyección subcutánea, comenzando 9 semanas después del parto; el programa puede continuar hasta 15 días antes del secado de la vaca.

- Permita que las jeringas alcancen la temperatura ambiente (15 - 30°C) antes de su administración.
- Evite altas temperaturas y exposición a la luz solar.
- Inyecte el total del contenido de la jeringa.

Inyecte **Lactotropina<sup>®</sup>** por la vía subcutánea (bajo la piel).

Los sitios recomendados para aplicar la inyección son: en el área del cuello, en la región pos-escapular (por detrás del hombro) o en la depresión a los dos lados de la base de la cola, en cualquiera de los dos lados. Alterne el lado derecho e izquierdo de la vaca en inyecciones consecutivas. Se debe tener cuidado para evitar el hueso, los músculos y tendones de la cola, así como los músculos anales y rectales. El sitio de

inyección debe estar libre de suciedad superficial. Inyecte el contenido completo subcutáneamente. No vuelva a utilizar las jeringas.



## NO inyecte en el pliegue caudal de la cola.

Las estructuras que se deben evitar pueden localizarse fácilmente al levantar la cola del animal.

- Si el uso de **Lactotropina<sup>®</sup>** se interrumpió, se podrá continuar más adelante en la lactación.
- Se recomienda un buen manejo y nutrición para una óptima producción.
- La respuesta en producción de cada vaca puede variar.

## EFFECTOS COLATERALES :

Se puede desarrollar inflamación temporal en el sitio de inyección.





**PERÍODO DE RETIRO:**

No se requiere eliminar la leche o dejar un periodo de espera para el sacrificio durante su uso.

**ADVERTENCIAS:**

Evite el contacto prolongado o repetido con los ojos, boca, piel y ropa.

**Lactotropina**<sup>®</sup> es una proteína. El contacto frecuente de la piel con proteínas puede ocasionar una reacción alérgica en ciertos individuos, por lo que se recomienda lavarse bien las manos y piel con jabón y agua. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**ALMACENAMIENTO:**

Almacenar en refrigeración (2-8°C). NO CONGELAR.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Importado y distribuido por:

**LAPISA, S.A. de C.V.**

Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5,

Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel +52 (352) 5261300

www.lapisa.com.

Elaborador por:

**Union Agener, INC. 1788 Lovers Lane,**

Augusta, Georgia, 30901,

Estados Unidos de América.

**Lactotropina**<sup>®</sup>, Número de registro Q-2083-212

(Somatotropina bovina zinc). Material para uso del médico veterinario.

295-SAN-FT-01A.

