

Nueva fórmula

Lapimicina[®] **L.A.**

APLICACIÓN SUBCUTÁNEA



MODERNIDAD • UTILIDAD • EFICACIA



VENTAJAS DE NUEVA FÓRMULA

Las lesiones en los sitios de inyección cuestan a la industria cárnica millones de pesos anuales, estas pérdidas se deben al decomiso de áreas dañadas en la canal, la disminución en el precio de los cortes y a la inconformidad de los consumidores.

Las inyecciones intramusculares pueden dejar cicatrices que llegan a persistir hasta por un período de 16 a 17 meses post administración y las pérdidas económicas se estiman hasta en \$9.58 USD por inyección dependiendo del precio del corte, la proporción de lesión, y al número y peso promedio del trozo decomisado.

Lapimicina® L.A. subcutánea nueva fórmula, fue diseñada y adaptada a las necesidades modernas de la industria cárnica nacional e internacional, elevando la respuesta clínica, la calidad de su canal y la utilidad de su negocio.

Lapimicina® L.A. es un antibiótico inyectable de amplio espectro, estéril y listo para usarse.

Cada mL contiene 200 mg de oxitetraciclina a fin de lograr niveles elevados de oxitetraciclina en sangre en un período de 3 a 5 días en bovinos, ovinos y caprinos, después de una sola aplicación.

La acción prolongada de **Lapimicina® L.A.** se debe en gran parte a su vehículo, el cual permite una liberación controlada de la oxitetraciclina.

INDICACIONES:

La alta concentración de antibiótico por mL de **Lapimicina® L.A.** permite una combinación de amplio espectro y acción prolongada. Esta propiedad favorece su uso tanto en tratamientos curativos como tratamientos profilácticos (metafilaxia).

En ovinos y caprinos se usa para el tratamiento de infecciones respiratorias, pierna negra, gabarro, mastitis sistémica, artritis infecciosa y heridas infectadas.

DOSIS:

Bovinos por vía subcutánea: 1 mL por cada 10 Kg de peso vivo (20 mg/Kg de peso).

Ovinos y caprinos: 1 mL por cada 10 Kg de peso (20 mg/Kg de peso).

ADVERTENCIA:

No usar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

No utilizar para consumo la leche procedente de animales tratados con este producto, hasta 60 horas después de la última aplicación.

PRESENTACIONES:

Frascos con: 100, 250 y 500 mL.

Aplicación intramuscular, producto "X"



Aplicación subcutánea, **Lapimicina® L.A.**



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

USO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

LAPISA, S.A. DE C.V.
Km. 5.5 Carr. La Piedad-Guad.
La Piedad, Michoacán, México.
Tel. 01 (352) 52 613 00
www.lapisa.com

