

REG. SAGARPA Q-2083-163

Ovosure[®]

EFICIENCIA REPRODUCTIVA




Lapisa[®]
SALUD ANIMAL




AUMENTE SU EFICIENCIA REPRODUCTIVA CON ESTOS PROTOCOLOS DE USO:



1 Para favorecer el reinicio de la actividad Ovárica Postparto:



3 El programa para la sincronización de la ovulación:



5 Para mejorar la tasa de concepción: Administrándolo en vacas con más de tres servicios al momento de la I.A.




6 Para evitar reabsorciones embrionarias tempranas:



Ovosure®

REG. SAGARPA Q-2083-163

2 Para acortar el intervalo entre partos y disminuir costos:



4 Programa para la inseminación a tiempo fijo con pre-sincronización:



7 Para la resolución de quistes ováricos, aplique:



Boviprost®

REG. SAGARPA Q-2083-077

FÓRMULA:

Cada mL contiene
Cloprostenol 250 mcg
Vehículo c.b.p. 1 mL

INDICACIONES:

En Bovinos: Para la inducción y la sincronización del celo, término de gestaciones no deseadas, remoción de fetos momificados, endometritis crónica, piometra, sincronización del celo, para el tratamiento de quistes luteínicos.

DOSIS

Bovinos: Administrar una dosis de 2 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda.

ADVERTENCIAS

Evítese el contacto con la piel en humanos, no debe de ser manejado por mujeres embarazadas y personas asmáticas ya que puede producir aborto o bronco espasmos.

En caso de contacto con la piel lavar el área con abundante agua y jabón inmediatamente.

Evitar la administración de **Boviprost®** en animales gestantes a menos que desee el aborto.

Almacenar en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar directa.

PRESENTACIONES:

Frasco con 20 mL



Ovosure®

REG. SAGARPA Q-2083-163

FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Gonadorelina (como acetato) 100 mcg
Vehículo c.b.p. 1 mL

INDICACIONES:

• Reactiva la actividad ovárica cuando es aplicado el día 12 posparto.

• Induce la ovulación mejorando la fertilidad posparto cuando es aplicado en programas de sincronización, monta o de la inseminación artificial.

• El tratamiento de quistes ováricos y en la prevención de fallas en la ovulación.

DOSIS:

Bovinos:

Mejoramiento de la fertilidad posparto: 2.5 mL
Sincronización de estros: 1.0 mL
Retraso en la ovulación: 2.5 mL
Tratamiento de quistes ováricos: 5.0 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o intravenosa.

ADVERTENCIAS:

Tiempo de retiro:

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

Almacénese a temperaturas inferiores a 25 °C, en un lugar seco y protegido de la luz.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Frasco con 50 mL



AGOSTO2011B

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO

Hecho en México por:
LAPISA, S.A. DE C.V.
Km. 5.5, Carr. La Piedad-Guad.
La Piedad, Michoacán, C.P. 59300, México.
Tel. (352) 52 613 00
www.lapisa.com

