



**PROGRAMA DE CALIDAD DE LECHE**  
PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PARA MASTITIS

# PROGRAMA DE CALIDAD DE LECHE

## Protocolo de tratamiento para mastitis

### Leche con alta conductibilidad

Alternativa	Producto	Dosis	Vía de administración	Días de tratamiento	Días retiro
1	TRIPAROX	de 1 a 3 mL	I.M.	1	0
2	FORTIMUNE®	10 mL	I.M.	1	0

### Mastitis subclínica

Alternativa	Producto	Dosis	Vía de administración	Días de tratamiento	Días retiro
1	FORTIMUNE®	10 mL	I.M.	4	0
	FOSEL® ED	20 mL	S.C.	1 y 14	0
2	FORTIMUNE®	10 mL	I.M.	3	0
	MINOXEL PLUS	20 mL	I.M.	3	0

### Mastitis grado 1: Vaca: Normal Temperatura: Normal Leche: Ligeros grumos Ubre: Normal

Alternativa	Producto	Dosis	Vía de administración	Días de tratamiento	Días retiro
1	TRIPAROX	de 1 a 3 mL	I.M.	2	0
2	FORTIMUNE®	10 mL	I.M.	3	0
3	MINOXEL PLUS	20 mL	I.M.	3	0
	FORTIMUNE®	10 mL	I.M.	2	0
4	LAPIPEN® 300	1 mL x cada 15 Kg de peso	I.M.	3	2
	PRIMECIN® INY.	1 mL x cada 30 Kg de peso	I.M.	3	2

### Mastitis grado 2: Vaca: Normal o triste Temperatura: Fiebre ligera Leche: Grumos Ubre: Inflamada

Alternativa	Producto	Dosis	Vía de administración	Días de tratamiento	Días retiro
1	TRIPAROX	de 1 a 3 mL	I.M.	2	0
	AMPIPEN	10 mL x cada 100 Kg de peso	I.V.	3	3
	FLUNIDIN®	20 mL	I.V.	2	12 hr.
2	TRIPAROX	de 1 a 3 mL	I.M.	2	0
	KANAMIX	30 mL	I.V.	3	3
	FLUNIDIN®	20 mL	I.V.	2	12 hr.

### Mastitis grado 3: Vaca: Triste Temperatura: Fiebre alta Leche: Secreción serosa ó grumos Ubre: Inflamada

Alternativa	Producto	Dosis	Vía de administración	Días de tratamiento	Días retiro
1	LAPIMICINA®	2 mL x cada 10 Kg de peso	I.V.	3	3
	PRIMECIN® INY	30 mL	I.M. ó I.V.	3	2
	FLUNIDIN®	20 mL	I.V.	3	12 hr.
	MASTRIX	Aplicar 1 tubo	Intramamaria	3	4
2	LAPIMICINA®	2 mL x cada 10 Kg de peso	I.V.	3	3
	SULFATROPIN®	30 mL	I.V.	3	3
	FLUNIDIN®	20 mL	I.V.	3	12 hr.
	MASTRIX	Aplicar 1 tubo	Intramamaria	3	4

### Mastitis Reincidentes: Vacas que regresan enfermas del mismo cuarto antes de 20 días.

Alternativa	Producto	Dosis	Vía de administración	Días de tratamiento	Días retiro
A	MAMITROL® FUERTE	Aplicar 1 tubo	Intramamaria	4	4
B	LAPIPEN® 300	2 mL x 15 Kg de peso c/12 hrs.	I.M.	5	2
C	KANAMIX	30 mL I.M. 30 mL I.V.		3	3
D	DIRAMOX® LA	1 mL x cada 10 Kg de peso	I.M.	5	3
	MASTICEF®	Aplicar 1 tubo	Intramamaria	5	3

Objetivo: Obtención de una rápida respuesta clínica y evitar leche contaminada por el uso indiscriminado de antibióticos

LAPISA, S.A. DE C.V.  
Km. 5.5 Carr. La Piedad-Guad.  
La Piedad, Michoacán, México.  
Tel. 01 (352) 52 613 00  
www.lapisa.com



EMPRESA CON SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO



Anrripen, Fortimune®, Flunidin®, Fosef® ED, DiramoX® LA, Kanamix, LapiPen® 300, Lapimicina®, Mastrof® Fuerte, Mastrof®, Minoxel Plus, Moxicof®, Primecin® Inyectable, Sulfatropin® y Triparox.  
 Registros SAGARFPA Q-2083-007, 159, 074, 127, 045, 052, 095, 004, 112, 076, 073, 067, 046, 040 y 121 respectivamente.

AG0051020115