

Minoxel **8G**

CEFTIOFUR SÓDICO 8G

**“CONTROLANDO LA MORTALIDAD
TEMPRANA DE LOS POLLITOS”**



Minoxel 8G

TRATAMIENTO DE LA MORTALIDAD DE LOS POLLITOS.

¿Por qué debe utilizar **Minoxel 8G** ?

La mortalidad en pollitos durante los primeros 14 días de vida ocasiona graves pérdidas económicas para la industria avícola, reduciendo la viabilidad y la eficiencia en su empresa.

Minoxel 8G está indicado en la reducción de la mortalidad temprana en pollitos de 1 día de edad asociada a variedades de *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus* sensibles al ceftiofur sódico.

El Ceftiofur sódico, ingrediente activo del **Minoxel 8G** es muy estable en presencia de organismos productores de β -lactamasa como las enterobacterias y los estafilococos.

Minoxel 8G es activo contra bacterias Gram (+) y Gram (-) que generalmente son resistentes a otros antibióticos.



PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5
Reconstituir con 100 mL de diluyente de la vacuna de Marek en un frasco de 8G de Ceftiofur. Agitar vigorosamente	Retirar la dosis deseada: 2 mg/Kg PV= 1mL 4 mg/Kg PV= 2 mL	Mezclar 1 mL con 199 mL del diluyente de la vacuna de Marek para obtener 200 mL. Mezclar 2 mL con 198 mL del diluyente de la vacuna de Marek para obtener 200 mL	Mezclar suavemente la vacuna de Marek con el diluyente	Aplicar en el tercio medio del cuello 0.2 mL por ave

AG06102011 A

Minoxel 8G puede ser adicionado a la Vacuna de Marek sin afectar las unidades formadoras de placa (UFP)

FÓRMULA:

Cada frasco del polvo para reconstituir contiene:
Ceftiofur sódico.....8 g

RENDIMIENTO:

Un frasco de **Minoxel 8G** permite dosificar de 50,000 a 100,000 pollitos de 1 día de edad (40 g) en las dosis de 2 a 4 mg/Kg de P.V. Dosis para pavos un día de edad 0.17-05mg/kg pv.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto reconstituido en refrigeración entre 2° C y 7° C hasta 7 días o a temperatura ambiente controlada entre 15° C y 30° C hasta 12 horas. El color del polvo puede variar del blanco al crema sin afectar la integridad del producto.

PRESENTACIÓN:

Frasco de vidrio traslúcido con 8g de polvo acompañado de frasco con 100 mL de diluyente para reconstituir.
Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

USO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

LAPISA, S.A. DE C.V.
Km. 5.5 Carr. La Piedad-Guad.
La Piedad, Michoacán, México.
Tel. 01 (352) 52 613 00
www.lapisa.com



EMPRESA CON SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

