

Dorso Pet®

permetrina

INSECTICIDA DE USO PECUARIO POUR ON / LIQUIDO ACEITOSO

Para el control de Pulgas, Piojos y Garrapatas.

COMPOSICION PORCENTUAL:

PERMETRINA:3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -3-(2,2-diclorovinil) - 2,2 - dimetilciclopropanocarboxilato (60% de isómero trans y 40% de isómero cis) 7.4% (Equivalente a 64.9 g de i.a./L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES: Agente sinergista y diluyente 92.60%

TOTAL 100%

RSCO-PEC-INAC-0156-395-378-007

Contenido Neto: 1 empaque con 3 pipetas cada uno, de 0.5, 1, 2 y 3 mL.

“INSTRUCCIONES DE USO”

INDICACIONES:

DORSO PET® es un producto a base de un piretroide y un sinergista, con acción sobre poblaciones de Pulgas, Piojos y Garrapatas.

DORSO PET® controla nuevas infestaciones por pulgas hasta por 28 días tras la aplicación de 1 pipeta. Para el tratamiento y control de dermatitis alérgica por piquete de pulgas (DAP), se recomiendan aplicaciones mensuales en animales alérgicos y otros perros que con ellos vivan.

DORSO PET® controla infestaciones causadas por piojos masticadores del género *Trichodectes canis* en perros y cachorros.

DORSO PET® controla reinfestaciones causadas por todas las etapas de desarrollo de garrapatas del genero *Rhipicephalus*, *Dermacentor* e *Ixodes*.

MECANISMO DE ACCION:

La permetrina es un piretroide que posee acción neurotóxica sobre las membranas nerviosas de los ectoparásitos, provocando excitación, trastornos de coordinación, parálisis y muerte. El efecto sinergista del butóxido de piperonilo sobre las enzimas de la resistencia, previene la degradación de la permetrina multiplicando su acción.



ADMINISTRACION Y MODO DE USO:

DOSIS: DORSO PET® son pipetas de dosis única, cada pipeta contiene la dosis mínima recomendada para el tratamiento con **Permetrina en perros:**

Una pipeta de 0.5 mL para perros con peso menor de 5 kg

Una pipeta de 1 mL para perros con peso entre 6 - 15 kg

Una pipeta de 2 mL para perros con peso entre 16 - 30 kg

Una pipeta de 3 mL para perros con peso entre 31 - 45 kg

DORSO PET® se puede aplicar en cachorros a partir de 8 semanas de edad, así como hembras preñadas o lactantes.

Modo de uso: Uso tópico exclusivamente. Aplicar una pipeta cada 28 días tanto tiempo como lo aconseje el Médico Veterinario.

Evite el contacto con la piel del perro después de la aplicación de DORSO PET® hasta que se absorba el producto en la piel. No bañar al perro dos días antes ni dos días después del tratamiento.

DORSO PET® es tóxico para felinos.



Romper la línea punteada de la pipeta. Apartar el pelo hasta observar la piel.

Vaciar el contenido de la pipeta de forma homogénea en tres puntos de la piel: el cuello, los hombros y la cadera.