

Sulfatropin® Plus

Polvo Soluble

REG. SAGARPA Q-2083-043

FORMULA:

Cada 100 g contienen:

Sulfacloropiridazina sódica	10 g
Trimetoprim	2 g
Vehículo c.b.p.	100 g



INDICACIONES:

Está indicado en el tratamiento de las enfermedades infecciosas de las aves, cerdos y terneros causados por organismos susceptibles a la acción de la fórmula.

Aves de corral: colibacilosis, ECR, tifus aviar, pulorosis, salmonelosis, coriza infecciosa, cólera aviar, etc.

Cerdos: colibacilosis, colienterotoxemia, diarreas bacterianas, bronconeumonía, neumonía enzootica, rinitis atrófica, complejo MMA.

Terneros: diarreas, gastroenteritis, colisepticemia, bronconeumonía, poliartrosis, difteria de los terneros, infecciones del ombligo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, disuelto en agua o mezclado con el alimento terminado.

DOSIS:

En aves y cerdos, Las siguientes tablas sirven de referencia.

AVES	Edad en semanas	Cantidad de Sulfatropin® Plus soluble	
		Por ton de alimento	Por cada 100 litro de agua.
Pollos de engorda	1-4	1.5 kg	100 g
	5-8	2.5 kg	150 g
Pollos de cría	1-8	2.0 kg	100 g
	9-20	3.0 kg	150 g
Gallina Ponedora	20	2.5 kg	150 g
Pavos	20	2.5 kg	100 a 150 g

CERDOS	Peso del animal	Cantidad de Sulfatropin® Plus soluble	
		Por ton. de alimento	Por cada 100 litros de agua.
Lechones	Hasta 9 kg	7-10 kg	200-350 g
Lechones destetados	10-23 kg	4-5 kg	100-200 g
Cerdos en engorda	24-105 kg	5-7 kg	200-300 g
Cerdas antes o después del parto MMA	175 kg (promedio)	11 kg	
Cerdas en lactación	175 kg (promedio)	5-7 kg	100-200 g

TERNEROS:

Administrar 10 g de Sulfatropin® plus por cada 50 kg de peso vivo durante 5 a 10 días, disuelto en la leche. Dividir la dosis y administrar la mitad en la mañana y la mitad en la tarde.

ADVERTENCIAS:

No usar este producto 4 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

PRESENTACIONES:

Cubetas de 5 kg.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA