

TICOFF[®] cipermetrina

**GARRAPATICIDA Y MOSQUICIDA PARA GANADO,
CONCENTRADO EMULSIONABLE
REG. RACO INAC 111-12-2083-001**

FORMULA:

Composición porcentual	En peso
Cipermetrina: 2 ciano-3 Fenoxibencil, Trans 3-(2, 2 diclorovinil -3,2) ciclo Propano carboxilato. (Equivalente a 200 g de i.a./L a 20°C)	20.00 %
Emulsionante, solvente	80 %
Total	100 %

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

La Cipermetrina es un piretroide sintético usado como insecticida para el control de infinidad de plagas, directamente sobre los animales o sobre los cultivos, incluyendo polillas del algodón, frutas, y cosecha de vegetales. también es usado en grietas y hendiduras superficies para el control de insectos en tiendas, almacenes, industrias, casas, apartamentos, viveros, laboratorios, barcos, trenes, autobuses, camiones, y aviones. Se puede utilizar también en escuelas (excepto áreas de alimentación) hospitales, hoteles, plantas procesadores de alimentos y como tratamiento de barrera repelente en caballos.

Al aplicarse sobre los animales se absorbe por piel en baja proporción (1% en 24 horas en ratas), aunque su detoxificación es muy rápida y no se acumula en los tejidos del animal ni en el medio ambiente a diferencia de los pesticidas. Se metaboliza rápidamente en el hígado por reacciones de hidrólisis y oxidación

USO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE

Ticoff[®] actúa sobre todos los estadios de las garrapatas de uno o varios hospederos con una excelente eficacia y prolongado efecto residual (10-14 días). Ticoff[®] también controla otros parásitos externos que afectan al ganado causando irritación, dolor, y molestias, tales como: mosca del establo, mosca de la paleta, mosca de la cara, así como tábanos, piojos y ácaros.

ESPECIES PARA LAS QUE SE RECOMIENDA EL PRODUCTO

Ganado bovino.



DOSIFICACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Baño de inmersión:

Carga:

Cubicar el volumen del baño, utilice 1 litro de Ticoff[®] por cada 1000 litros de agua. Mezcle previamente la cantidad necesaria de Ticoff[®] en una cantidad igual de agua y agregue esta mezcla al agua del baño de inmersión.

Recarga:

Agregue 1.5 litros por cada 1000 litros de agua.

Baño de aspersión:

Prepare una mezcla con 15 ml de Ticoff[®] por cada 10 litros de agua y asperje con gota fina a todo el animal.

Instalaciones:

Aplicar 3 mL de Ticoff[®] por litro de agua.

PERIODO DE RETIRO

Baños de inmersión:

Animales de carne: 4 días

Leche: 1 día

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.

- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE SU CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.

PRESENTACION:

30 mL.

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

