


“USO AGRÍCOLA”

Lapisa ®
AGRÍCOLA



Agriver® 1.8 CE

abamectina

Insecticida - acaricida,
Concentrado Emulsionable

COMPOSICION PORCENTUAL

Ingrediente activo:

Abamectina (Avermectina): Mezcla de avermectinas B1
conteniendo no más de 80% de avermectina B1a y no menos
de 20% de avermectina B1b
(Equivalente a 18 g de i.a./L a 20 °C)

Ingredientes inertes:

Vehículo, emulsificantes, antioxidante, y ajustador de pH

% en Peso

1.80

98.20

Total 100.00

Registro: RSCO-INAC-0174-308-009-002



“Tóxico en caso de ingestión”
“Tóxico si se inhala”

Titular del registro, Formulado y Distribuido por:

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad-Guadalajara Km. 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel.: 01(352) 526 13 00.

www.lapisa.com

HECHO EN MEXICO

“ ESTE MATERIAL NO ES UNA ETIQUETA, LA FUNCION DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER ILUSTRATIVO.”

PELIGRO

“ALTO: LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo para la preparación, la carga del equipo de aplicación y su aplicación: gorra y overol de algodón y/o traje de Tyvek, mascarilla contra líquidos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”.

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.

“LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”.

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica o llame al Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) para asistencia médica las 24 horas sin costo al 01-800-000-2869, mientras tanto, se recomienda aplicar las siguientes medidas de primeros auxilios:

Inhalación: Traslade la persona contaminada al aire fresco. Si no respira, suminístrele respiración artificial, preferiblemente de boca a boca.

Ingestión: Dele inmediatamente uno o dos vasos con agua e induzca el vómito tocando suavemente el fondo de la garganta con un dedo, u objeto sin filo. No induzca al vómito ni administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Piel: Lave con abundante agua y jabón.

Ojos: Enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”

Grupo Químico: Avermectinas (Lactona macrocíclica, producto de fermentación natural del hongo *Streptomyces avermitilis*).

Antídoto: No se conoce un antídoto específico. Use tratamiento sintomático.

Tratamiento: La intoxicación seguida por la ingestión del producto, puede ser minimizada, induciendo al vómito durante los treinta primeros minutos. Si la toxicidad llega a causar vómito severo, debe evaluarse el grado de desequilibrio electrolítico apropiado, junto con otras medidas de soporte (mantenimiento de la presión arterial), como lo indiquen los signos, síntomas y demás mediciones clínicas. En casos severos, se debe continuar observando al paciente durante varios días, hasta que la condición clínica sea estable y normal. Debido a que la Abamectina aumenta la actividad del ácido gamma aminobutírico en animales, es prudente evitar drogas que aumenten la actividad de la sustancia (barbitúricos, benzodiazepinas, ácido valpróico) en pacientes con una toxicidad potencial por exposiciones a la Abamectina.

Signos y Síntomas de Intoxicación: Oral e inhalatoria: los primeros síntomas de intoxicación que se presentan son la dilatación de las pupilas, falta de coordinación y convulsiones.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE


“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACION”.



“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Agriver® 1.8 CE es un insecticida / acaricida para usarse según las condiciones y en los cultivos autorizados. Controla los estados móviles de los ácaros y estados larvales de los minadores de hoja. **Agriver® 1.8 CE** inmoviliza las plagas poco después de la exposición. La mortalidad máxima se alcanza entre los 3 y 7 días, durante este periodo la alimentación y el daño son mínimos.

RECOMENDACIONES

Cultivo	Ácaro ó insecto	Nombre científico	Dosis	Intervalo entre la última aplicación y la cosecha (días)
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.5 - 1.2 L / Ha	3
Jitomate (tomate)	Minador de hoja	<i>Liriomyza sp</i>	0.3 - 1.0 L / Ha	3
Pimiento (chile bell)	Ácaro blanco	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>		
Calabacita, Calabaza, Melón y Pepino	Minador de la hoja	<i>Liriomyza sp</i>	0.3 - 1.2 L / Ha	7
Lima, Limonero, Naranja, Toronjo	Arador de los cítricos	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	400 mL / Ha	7
Aguaacatero	Araña roja	<i>Oligonychus perseae</i>	0.5 - 1.0 L / 1000 L de agua	14

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: NO ENTRE AL AREA TRATADA ANTES DE LAS 24 HRS.

Agriver® 1.8 CE puede ser utilizado para tratamientos preventivos y/o curativos. Consulte al representante sobre recomendaciones actualizadas. La temperatura, los diferentes valores de pH y la dureza del agua, normalmente encontradas en condiciones agrícolas, no afectan el desempeño de **Agriver® 1.8 CE**. Mantenga la mezcla en agitación una vez que se mezcle con agua. La mezcla debe ser aplicada el mismo día. Evite utilizarla de un día para otro.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO Y RESTRICCIONES DE USO Antes de abrir, revise que el envase esté debidamente cerrado. Proceda a retirar el sello de seguridad y con la ayuda de una probeta proceda a medir la cantidad de producto que va aplicar. Mezcle el producto con agua en un envase por separado, posteriormente agite y proceda a vaciar su contenido en el tanque de aplicación continuando su agitación.

FRESA: No exceda de 1,000 L de agua/Ha y evite el escurrimiento o goteo. Aplique dos veces seguidas con intervalos de 7 días y repita la misma secuencia cuando sea necesario, una vez que se presenten los ácaros o primeros síntomas. Asegúrese de una cobertura total. Use la dosis menor en infestaciones bajas y en infestaciones altas, aumente la dosis. No aplique más de 5 litros de **Agriver® 1.8 CE** / Ha, por ciclo de cultivo.

JITOMATE (TOMATE): Aplique tan pronto como los ácaros, adultos de minadores de hoja o sus picaduras aparezcan. Para ácaros repita la aplicación como sea necesario para mantener el control. Para minadores de la hoja repita la aplicación, al menos con intervalos de 7 días. Cuando las plantas sean grades y densas, o en infestaciones altas, utilice las dosis mayores. No aplique más de 12 litros de **Agriver® 1.8 CE** / Ha, por ciclo de cultivo.

PIMIENTO (CHILE BELL): Aplique tan pronto como los ácaros, adultos de minadores de hoja o sus picaduras aparezcan. Para ácaros repita la aplicación como sea necesario para mantener el control. Para minadores de la hoja repita la aplicación, al menos con intervalos de 7 días. Cuando las plantas sean grades y densas, o en infestaciones altas, utilice las dosis mayores. No aplique más de 5 litros de **Agriver® 1.8 CE** / Ha, por ciclo de cultivo.

CALABACITA, CALABAZA, MELON Y PEPINO: Aplique tan pronto como los adultos de minador de la hoja o sus picaduras aparezcan. Asegurando una cobertura total de las plantas. Para minadores de hoja repita la aplicación con intervalos de 7 días para mantener el control. Usar las dosis mas altas para infestaciones severas. No aplique más de 7.5 litros de **Agriver® 1.8 CE** / Ha, por ciclo de cultivo.

LIMA, LIMONERO, NARANJA, TORONJO: Aplicar después de la floración, cuando los ácaros aparezcan por primera vez y sobre fruta joven, repetir si es necesario para mantener el control. No aplicar más de 4.5 litros de **Agriver® 1.8 CE** por ciclo y se recomienda aplicarlo junto con aceite mineral agrícola a una dosis de 250 mL por cada 100 litros de agua.

AGUACATERO: Aplique dos veces seguidas con intervalos de 7 días, una vez que se presenten los ácaros o primeros síntomas. Asegúrese de una cobertura total. Use la dosis menor en infestaciones bajas y en infestaciones altas, aumente la dosis. No exceda de 1,000 L de agua/Ha y evite el escurrimiento o goteo.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35°C.

FITOTOXICIDAD: **Agriver® 1.8 CE** no es fitotóxico si es utilizado en forma específicamente recomendada en ésta etiqueta. Cuando se desconozca la fitotoxicidad potencial, deberá hacerse una pequeña prueba previa a su aplicación para evitar efectos indeseables.

INCOMPATIBILIDAD: **Agriver® 1.8 CE** es compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo, se recomienda efectuar una pequeña prueba de compatibilidad antes de proceder a su mezcla con otros materiales. Estas serán con aquellos productos que cuenten con registro en el cultivo indicado.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

GARANTÍA: LAPISA S.A. DE C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

