

“USO AGRICOLA”

Lapisa ®
AGRÍCOLA



Agriver® 1.8 PH

Abamectina
Insecticida, Polvo Humectable

Composicion Porcentual

% en Peso

Ingrediente activo:

Abamectina (Avermectina): Mezcla de avermectinas B1
conteniendo no menos del 80% de avermectina B1a y
no más del 20% de avermectina B1b.
(Equivalente a 18 g de i.a./kg)

No menos de: 1.80

Ingredientes inertes:

Antiapelmazante, emulsificantes, dispersante, ajustador de pH
vehículo y excipiente.

No más de: 98.20
TOTAL: 100.00

Reg: RSCO-INAC-0174-316-002-002



“Nocivo si se inhala”
“Nocivo en caso de ingestión”
“Nocivo por el contacto por la piel”

Formulado y Distribuido por:

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad-Guadalajara Km. 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel.: 01(352) 526 13 00.

www.lapisa.com

HECHO EN MEXICO

PRECAUCIÓN

ALTO: LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección adecuado completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo para la preparación, la carga del equipo de aplicación y su aplicación: gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.

NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.

NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.

LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.

AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.

NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.

NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica o llame al Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) para asistencia médica las 24 horas sin costo al 01-800-000-2869, mientras tanto, se recomienda aplicar las siguientes medidas de primeros auxilios:

En caso de contacto con la piel o la boca, lávese inmediatamente.

Retire al sujeto del área contaminada.

Remueva la ropa contaminada y lave las partes expuestas con abundante agua. Si ocurre vómito voltear al sujeto sobre el costado y asegurar que respire sin dificultad.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo Químico: Avermectinas (Lactona macrocíclica).

Antídoto: Use tratamiento sintomático.

Tratamiento: La intoxicación seguida por la ingestión del producto, puede ser minimizada induciendo el vómito dentro de los 30 primeros minutos después de la exposición. Si la toxicidad progresa hasta causar vómito severo, debe evaluarse el grado de desequilibrio electrolítico apropiado, junto con otras medidas de soporte (mantenimiento de la presión arterial), como lo indiquen los signos y síntomas y demás mediciones clínicas. En casos severos, se debe continuar observando al paciente por varios días, hasta que la condición clínica sea estable y normal. Debido a que la abamectina aumenta la actividad del ácido gamma aminobutírico en animales, es prudente evitar drogas que aumenten la actividad de esta sustancia (barbitúricos, benzodiazepinas, ácido valpróico) en pacientes con una toxicidad potencial por exposiciones a la abamectina.

Signos y Síntomas de Intoxicación: Oral e inhalatoria: los primeros síntomas de intoxicación que se presentan son la dilatación de las pupilas, falta de coordinación y convulsiones.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.



“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Jitomate (Tomate) (3)	Minador de la hoja <i>Liriomyza sp.</i>	750-1000 g/Ha	Aplicación al follaje.

() Intervalo de seguridad en días

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS

NO ENTRE AL ÁREA TRATADA ANTES DE LAS 24 HRS.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra la bolsa contenedora cuidadosamente por la parte superior y mida la cantidad de producto indicada en esta etiqueta. Mezcle en el tanque aspersor con la mitad de agua recomendada, luego agregue el resto de agua y agite la mezcla constantemente.

Aplique tan pronto los adultos de los minadores de hoja o sus picaduras aparezcan, repita la aplicación al menos con intervalos de 7 días. Cuando las plantas sean grandes y densas, o las infestaciones altas, utilice las dosis mayores.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar con vientos fuertes o temperaturas superiores a 35°C.

FITOTOXICIDAD:

AGRIVER 1.8 PH, no es fitotóxico si es utilizado en forma específicamente recomendada en esta etiqueta. Cuando se desconozca la fitotoxicidad potencial, deberá hacerse una pequeña prueba previa a su aplicación para evitar efectos indeseables.

INCOMPATIBILIDAD:

AGRIVER 1.8 PH, es compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo, se recomienda efectuar una pequeña prueba de incompatibilidad antes de proceder a su mezcla con otros materiales. Las mezclas solo podrán ser con aquellos productos que cuenten con aquellos productos que cuenten con registro en el cultivo y plaga indicado.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVÍTE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

GARANTÍA: LAPISA S.A. DE C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

