

“USO AGRÍCOLA”

**Lapisa**   
AGRÍCOLA

**CYMOX**   
**10**  
**cymoxanil**

Fungicida agrícola / Polvo humectable

**COMPOSICION PORCENTUAL**

**% en Peso**

**Ingrediente activo:**

**Cymoxanil:**

**10.0**

1-[(EZ)-2-ciano-2-metoxiiminoacetil]-3-etilurea  
(Equivalente a 100 g de i.a./kg)

**Ingredientes inertes:**

**90.0**

Antiapelmazante, dispersante y vehículo.

**TOTAL:**

**100.0**

**Registro: RSCO-FUNG-0362-305-002-010**



“Nocivo si se inhala”

**Titular del registro, Formulado y Distribuido por:**

**LAPISA, S.A. DE C.V.**

Carr. La Piedad-Guadalajara Km. 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel.: 01(352) 526 13 00.

[www.lapisa.com](http://www.lapisa.com)

**HECHO EN MEXICO**

**PRECAUCIÓN**

" ESTE MATERIAL NO ES UNA ETIQUETA, LA FUNCION DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER ILUSTRATIVO."

## “ALTO: LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

### “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo para la preparación, la carga del equipo de aplicación y su aplicación: gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno.

### “PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.

“LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”.

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

## “EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

### “PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica o llame al Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) para asistencia médica las 24 horas sin costo al 01-800-000-2869, mientras tanto, se recomienda aplicar las siguientes medidas de primeros auxilios:

Si se ingiere: proporcione inmediatamente 2 vasos de agua e induzca al vómito. Si la persona está inconsciente, no introduzca nada por la boca. Llame a un médico.

Si se inhala: retire a la persona afectada del área contaminada y recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira proporcione respiración artificial. Si se dificulta la respiración proporcione oxígeno.

Si hay contacto con la piel y los ojos: enjuague con abundante agua por un mínimo de 15 minutos. Si la irritación persiste consulte a su médico.

### “RECOMENDACIONES AL MEDICO”

**Grupo Químico:** Acetamida.

**Antídoto:** No se conoce un antídoto específico.

**Tratamiento:** Use tratamiento sintomático.

**Signos y síntomas de intoxicación:** Mareo, dolor de cabeza, tos, confusión, falta de coordinación y pérdida de conocimiento.

### “MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.



**“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”**  
**“INSTRUCCIONES DE USO”**  
**“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/Ha
Papa (15)	Tizón Tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	2-3
Pepino*, Melón*, Sandía, Calabacita*, Calabaza* (3)	Mildiu ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	1-2

( ) Intervalo de seguridad: días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

\*Bajo condiciones de agricultura protegida.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: NO ENTRE AL AREA TRATADA ANTES DE LAS 24 HRS.**

**METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO**

Abra cuidadosamente el envase y en un tambo con agua mezcle la cantidad de producto de acuerdo a las dosis recomendadas, utilice **CYMOX 10®** con fungicidas preventivos para complementar la acción curativa, agite hasta que quede el producto totalmente incorporado al agua, sin dejar de agitar llene con el agua faltante hasta llegar al volumen final deseado. Para obtener buenos resultados realice una buena cobertura de cultivo calibrando su equipo de aplicación. Se recomienda hacer dos aplicaciones con intervalo entre cada una de 7 días. Se recomienda hacer las aplicaciones en la mañana y sin viento.

Aplicación al follaje con volumen de agua de 430-530 L/ha.

**CONTRAINDICACIONES:**

No se aplique cuando el cultivo esté en condiciones de estrés como sequía, temperaturas bajas extremas, deficiencias nutricionales o cualquier otro factor que interfiera en el crecimiento del cultivo.

No usar como forraje restos de plantas tratadas con este producto.

Evite aplicar cuando existan posibilidades de lluvia para evitar el lavado del producto.

**FITOTOXICIDAD:**

**CYMOX 10®** no es fitotóxico si es utilizado en forma específicamente recomendada en esta etiqueta. Cuando desconozca la fitotoxicidad potencial deberá hacerse una pequeña prueba previa a su aplicación para evitar efectos indeseables.

**INCOMPATIBILIDAD:**

No mezclar con plaguicidas surfactantes y/o fertilizantes sin pruebas previas que demuestren compatibilidad.

Mezclar sólo con productos autorizados por la COFEPRIS.

**MANEJO DE RESISTENCIA**

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

**GARANTÍA:** LAPISA S.A. DE C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

